

虹口区 2023 学年度初三年级第二次学生学习能力诊断练习

数学 练习卷

(满分 150 分, 考试时间 100 分钟)

注意:

1. 本练习卷含三个大题, 共 25 题. 答题时, 请务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答, 在草稿纸、本练习卷上答题一律无效.
2. 除第一、二大题外, 其余各题如无特别说明, 都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤.

一、选择题: (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

[下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上.]

1. 下列各数中, 无理数是 ()

- A. $\frac{2}{11}$ B. 3.14159 C. $\sqrt{6}$ D. $1.\dot{2}$

2. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x + m = 0$ 无实数根, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $m < 1$ B. $m \leq 1$ C. $m \geq 1$ D. $m > 1$


3. 已知二次函数 $y = -(x-4)^2$, 如果函数值 y 随自变量 x 的增大而减小, 那么 x 的取值范围是 ()

- A. $x \geq 4$ B. $x \leq 4$ C. $x \geq -4$ D. $x \leq -4$

4. 下列事件中, 必然事件是 ()

- A. 随机购买一张电影票, 座位号恰好是偶数
B. 抛掷一枚质地均匀的硬币, 落地后反面朝上
C. 在只装有 2 个黄球和 3 个白球的盒子中, 摸出一个球是红球
D. 在平面内画一个三角形, 该三角形的内角和等于 180°

5. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 、 F 分别在边 BC 和 AD 上, $BE = 2$, $AF = 6$, 如果 $AE \parallel CF$, 那么 $\triangle ABE$ 的面积为 ()



A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

6. 在 $ABCD$ 中, $BC=5$, $S_{\square ABCD}=20$. 如果以顶点 C 为圆心, BC 为半径作 $\odot C$, 那么 $\odot C$ 与边 AD 所在直线的公共点的个数是 ()

A. 3 个

B. 2 个

C. 1 个

D. 0 个.

二、填空题: (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

[请将结果直接填入答题纸的相应位置]

7. 计算: $\sqrt[3]{-8} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 分解因式: $a^2 - 9b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.


9. 解不等式: $5x + 2 \leq 3(2 + x)$, 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 函数 $y = \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ 的定义域是 $\underline{\hspace{2cm}}$

11. 将抛物线 $y = (x-2)^2 + 1$ 先向右平移 3 个单位, 再向下平移 4 个单位后, 所得到的新抛物线的表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.


12. 在一个不透明袋子中, 装有 2 个红球和一些白球, 这些球除颜色外其他都一样, 如果从袋中随机摸出一个球是红球的概率为 0.25, 那么白球的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 某校为了解该校 1200 名学生参加家务劳动的情况, 随机抽取 40 名学生, 调查了他们的周家务劳动时间并制作成频数分布直方图, 那么估计该校周家务劳动时间不少于 2 小时的学生大约有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 名.




14. 一根蜡烛长 30 厘米, 点燃后匀速燃烧, 经过 50 分钟其长度恰为原长的一半. 在燃烧的过程中, 如果设蜡烛的长为 y (厘米), 燃烧的时间为 t (分钟), 那么 y 关于 t 的函数解析式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (不写定义域).


15. 如图, 正六边形螺帽的边长是 4cm, 那么这个扳手的开口 a 的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.




16. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $BC = 2AD$ ，点 E 、 F 分别是边 AB 、 CD 的中点，连接 AC ，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ，那么用向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{EF} =$ _____.



17. 如图，在 $ABCD$ 中， $AB = 7$ ， $BC = 8$ ， $\sin B = \frac{4}{5}$. 点 P 在边 AB 上， $AP = 2$ ，以点 P 为圆心， AP 为半径作 $\odot P$. 点 Q 在边 BC 上，以点 Q 为圆心， CQ 为半径作 $\odot Q$. 如果 $\odot P$ 和 $\odot Q$ 外切，那么 CQ 的长为 _____.



18. 如图，在扇形 AOB 中， $\angle AOB = 105^\circ$ ， $OA = 8$ ，点 C 在半径 OA 上，将 $\triangle BOC$ 沿着 BC 翻折，点 O 的对称点 D 恰好落在弧 AB 上，再将弧 AD 沿着 CD 翻折至弧 A_1D (点 A_1 是点 A 的对称点)，那么 OA_1 的长为 _____.




三、解答题：(本大题共 7 题，满分 78 分)

19. 先化简，再求值： $\frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 + 3m} \div \left(1 - \frac{4}{m + 3}\right)$ ，其中 $m = \sqrt{2}$.

20. 解方程组：
$$\begin{cases} 2x - y = 6 \\ x^2 - xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$



21. 如图，一次函数图像在反比例函数图像相交于点 $A(m, 2)$ 和点 $B(2, -4)$ ，与 y 轴交于点 C . 点 $D(-1, n)$

在反比例函数图像上，过点 D 作 x 轴的垂线交一次函数图像于点 E .




- (1) 求反比例函数和一次函数的解析式；
- (2) 求 $\triangle CDE$ 的面积.

22. 根据以下素材，完成探索任务.

探究斜坡上两车之间距离		
素材1	图①是某高架入口的横断面示意图. 高架路面用 BM 表示，地面用 AN 表示，斜坡用 AB 表示. 已知 $BM \parallel AN$，高架路面 BM 离地面的距离 BH 为 25 米，斜坡 AB 长为 65 米.  图①	
素材2	如图②，矩形 $ECKG$ 为一辆大巴车的侧面示意图，CK 长为 10 米，EC 长为 3.5 米. 如图③，该大巴车遇堵车后停在素材 1 中的斜坡上，矩形 $ECKG$ 的顶点 K 与点 B 重合，点 B 与指示路牌底端 P 点之间的距离 BP 为 6.5 米，且 $BP \perp BM$. 小张驾驶一辆小轿车跟随大巴车行驶，小张的眼睛到斜坡的距离 FD 为 1 米.  图② 图③	
问题 解 决	任务一	如图①，求斜坡 AB 的坡比.
	任务二	如图③，当小张正好可以看到整个指示路牌（即 P 、 E 、 F 在同一条直线上）时，试求小张距大巴车尾 EC 的距离 CD .

23. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，延长 CB 至点 D ，使得 $DB = CB$ ，过点 A 、 D 分别作 $AE \parallel BC$ ， $DE \parallel BA$ ， AE 与 DE 相交于点 E ，连接 BE 。




(1) 求证： $BE \perp CD$ ；

(2) 连接 AD 交 BE 于点 F ，连接 CE 交 AD 于点 G 。如果 $\angle FBA = \angle ADB$ ，求证： $AG = \frac{\sqrt{2}}{3} AB$ 。

24. 新定义：已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ （其中 $abc \neq 0$ ），我们把抛物线 $y = cx^2 + ax + b$ 称为

$y = ax^2 + bx + c$ 的“轮换抛物线”。例如：抛物线 $y = 2x^2 + 3x + 1$ 的“轮换抛物线”为 $y = x^2 + 2x + 3$ 。

已知抛物线 $C_1: y = 4mx^2 + (4m - 5)x + m$ 的“轮换抛物线”为 C_2 ，抛物线 C_1 、 C_2 与 y 轴分别交于点 E 、 F ，点 E 在点 F 的上方，抛物线 C_2 的顶点为 P 。




备用图

(1) 如果点 E 的坐标为 $(0, 1)$ ，求抛物线 C_2 的表达式；


(2) 设抛物线 C_2 的对称轴与直线 $y = 3x + 8$ 相交于点 Q ，如果四边形 $PQEF$ 为平行四边形，求点 E 的坐标；

(3) 已知点 $M(-4, n)$ 在抛物线 C_2 上，点 N 坐标为 $(-2, -7\frac{1}{2})$ ，当 $\triangle PMN \sim \triangle PEF$ 时，求 m 的值。


25. 在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，点 E 在射线 DA 上，点 F 在射线 AB 上，连接 CE 、 DF 相交于点 P ， $\angle EPF = \angle ABC$ 。



图①



图②



备用图

(1) 如图①, 如果 $AB = CD$, 点 E 、 F 分别在边 AD 、 AB 上. 求证: $\frac{AF}{DE} = \frac{DF}{CE}$;

(2) 如图②, 如果 $AD \perp CD$, $AB = 5$, $BC = 10$, $\cos \angle ABC = \frac{3}{5}$. 在射线 DA 的下方, 以 DE 为直径作半圆 O , 半圆 O 与 CE 的另一个交点为点 G . 设 DF 与弧 EG 的交点为 Q .

①当 $DE = 6$ 时, 求 EG 和 AF 的长;

②当点 Q 为弧 EG 的中点时, 求 AF 的长.